

Formulaire de consentement

Nom du patient(e): _____

Dossier #: _____

Descriptif du traitement: **Couronne / Ponts dentaire pour: #**

Je comprends que le traitement requit nécessitant des COURONNES et/ou des ponts fixes comporte certains risques et de possibles résultats infructueux, avec même la possibilité d'un échec. J'accepte d'assumer ces risques, les éventuels résultats infructueux et/ou les échecs associés, mais sans s'y limiter, aux éléments suivants :

Ces risques incluent, mais ne sont pas limités à :

- **Réduction de la structure dentaire :** afin de remplacer des dents cariées ou autrement traumatisées, il est nécessaire de modifier la ou les dents existantes afin que des couronnes et/ou des ponts puissent être placés dessus. La préparation des dents sera effectuée de manière aussi conservatrice que possible. Lors de la préparation des dents, des anesthésiques sont généralement nécessaires.
- **Sensibilité des dents :** Souvent, après la préparation des dents ou la réception de couronnes ou de ponts, les dents peuvent présenter une sensibilité. Il peut être léger à sévère. Cette sensibilité peut durer seulement pendant une courte période de temps ou peut durer pendant des périodes beaucoup plus longues. Si elle est persistante, prévenez-nous dans la mesure où cette sensibilité peut provenir d'une autre source.
- **Les dents piliers couronnées ou pontées peuvent nécessiter un traitement du canal radiculaire :** Les dents, après avoir été couronnées, peuvent développer une condition connue sous le nom de pulpite ou dégénérescence pulpaire. La dent ou les dents peuvent avoir été traumatisées par un accident, une carie profonde, une préparation intensive ou d'autres causes. Il est souvent nécessaire de faire des traitements de canal sur ces dents. Si les dents restent trop sensibles pendant de longues périodes après le couronnement, un traitement de canal peut être nécessaire. Rarement, la ou les dents peuvent former un abcès ou ne

pas cicatriser, ce qui peut nécessiter un traitement de canal, une chirurgie radiculaire ou éventuellement une extraction.

- **Fracture:** Les couronnes et les ponts peuvent éventuellement s'écailler ou se casser. De nombreux facteurs peuvent contribuer à cette situation, tels que la mastication de matériaux trop durs, des changements dans les forces de morsure, des coups traumatisants à la bouche, etc. Des fissures non observables peuvent se développer dans les couronnes à partir de ces causes.

- **Sensation inconfortable ou étrange :** Cela peut se produire en raison des différences entre les dents naturelles et les prothèses artificielles. La plupart des patients s'habituent généralement à cette sensation avec le temps. Dans des situations limitées, la douleur musculaire ou la sensibilité des articulations de la mâchoire (ATM) peuvent persister pendant des périodes indéterminées après la mise en place de la prothèse.

- **Longévité des couronnes et des ponts :** Il existe de nombreuses variables qui déterminent « combien de temps » les couronnes et les ponts peuvent durer. Parmi ceux-ci figurent certains des facteurs mentionnés dans les paragraphes précédents. De plus, la santé générale, une bonne hygiène bucco-dentaire, des examens dentaires réguliers, un régime alimentaire, etc. peuvent affecter la longévité. Pour cette raison, aucune garantie ne peut être donnée ou supposée être donnée.

Il est de ma responsabilité de demander l'attention du dentiste si des problèmes inattendus surviennent. Je suivrai avec diligence toutes les instructions, y compris la planification et la participation à tous les rendez-vous. Le non-respect du rendez-vous de cimentation peut entraîner l'échec ultime de la couronne / du pont à s'adapter correctement et des frais supplémentaires peuvent être facturés.

Patient's signature: _____

Date: _____