

# Formulaire de consentement

Nom du patient(e): \_\_\_\_\_

Dossier #: \_\_\_\_\_

**Descriptif du traitement: Extraction dentaire pour: #**

Par la présente, j'autorise et ordonne à mon dentiste d'effectuer une extraction dentaire chirurgicale (ou sur toute personne identifiée ci-dessous comme le patient, pour laquelle je suis apte à consentir).

Je comprends qu'il peut être nécessaire de placer une matrice osseuse synthétique stérilisée pour aider à augmenter l'alvéole d'extraction pour les futurs implants dentaires, ponts ou prothèses dentaires. L'extraction des dents est un processus irréversible et qu'il soit routinier ou difficile est une intervention chirurgicale. Nous ferons tout notre possible pour que votre traitement se déroule sans problème. Comme dans toute intervention chirurgicale, il existe certains risques.

**Ces risques incluent, mais ne sont pas limités à :**

- Gonflement et/ou ecchymose et inconfort dans la zone chirurgicale.
- Infection possible nécessitant un traitement supplémentaire.
- Alvéolite sèche - douleur à la mâchoire commençant quelques jours après la chirurgie, nécessitant généralement des soins supplémentaires, elle est plus fréquente lors d'extractions inférieures, en particulier les dents de sagesse.
- Dommages possibles aux dents adjacentes, en particulier celles avec de grosses obturations ou capuchons.
- Les dents du bas au postérieur sont adjacentes à un gros nerf. Engourdissement ou sédation altérée des dents, des lèvres, de la langue et du menton, en raison de la proximité des racines des dents (en particulier des dents de sagesse) avec les nerfs qui peuvent être contusionnés ou blessés. La sensation revient le plus souvent à la normale, mais dans de rares cas, la perte peut être permanente.
- Trismus - ouverture limitée de la mâchoire en raison d'une inflammation ou d'un gonflement, le plus courant après le retrait d'une dent de sagesse. Parfois, c'est le résultat d'une gêne articulaire de la mâchoire (ATM), en particulier lorsque la maladie et les symptômes de l'ATM existent déjà.
- Saignement - un saignement important n'est pas courant, mais un saignement persistant peut être attendu pendant plusieurs heures.
- Enlèvement incomplet de fragments dentaires – pour éviter de blesser des structures vitales telles que les nerfs ou les sinus, parfois de petites pointes de racine peuvent être laissées en place.

-----  
Je comprends parfaitement la nature de ce traitement ainsi que les difficultés qui y sont liées. Je comprends qu'il est toujours possible que l'une des complications citées ci-dessus se produise. Je comprends également que je devrais suivre les instructions post-opératoires données après mon dentiste.

Signature de patient(e): \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_