

Consentement au traitement orthodontique

Nom du patient :

N° de dossier du patient :

Le traitement orthodontique reste une procédure élective. Comme d'autres traitements, il a des risques et des limites inhérents. Ceux-ci empêchent rarement le traitement, mais doivent être pris en compte dans la prise de décision de suivre un traitement.

FACTEURS IMPRÉVISIBLES POUVANT AFFECTER LE RÉSULTAT DU TRAITEMENT ORTHODONTIQUE:

- **Habitudes musculaires :** la respiration par la bouche, la succion du pouce, des doigts ou des lèvres, la poussée de la langue, et d'autres habitudes inhabituelles peuvent empêcher les dents de se déplacer vers leurs positions corrigées ou provoquer une rechute après le retrait de l'appareil dentaire.

- **Croissance faciale :** Des modèles squelettiques inhabituels et une croissance faciale insuffisante ou indésirable peuvent compromettre les résultats dentaires, affecter un changement facial et provoquer un déplacement des dents pendant la rétention. Une assistance chirurgicale peut être recommandée dans ces situations.

- **Mouvement des dents après le traitement :** Les dents ont tendance à se déplacer après le traitement ainsi qu'après la rétention. Certains changements sont souhaitables; d'autres ne le sont pas. Les rotations et l'encombrement des dents de devant inférieures ou un léger espace dans le site d'extraction sont des exemples courants.

- **Problèmes temporomandibulaires (ATM):** Des problèmes éventuels d'ATM ou d'articulation de la mâchoire peuvent se développer avant, pendant ou après un traitement orthodontique. La position des dents, la morsure ou les problèmes préexistants de l'ATM peuvent être un facteur dans cette condition.

- **Dents incluses :** lors d'une tentative de déplacement de dents incluses (dents incapables de

pousser normalement), en particulier les canines et les troisièmes molaires (dents de sagesse), divers problèmes sont parfois rencontrés, pouvant entraîner des problèmes parodontaux, une rechute ou la perte de dents.

- **Résorption radiculaire :** Le raccourcissement des extrémités radiculaires peut se produire lorsque les dents sont déplacées pendant le traitement orthodontique. Dans des conditions saines, les racines raccourcies ne posent généralement aucun problème. Un traumatisme, une impaction, des troubles endocriniens ou des raisons idiopathiques (inconnues) sont également à l'origine de ce problème. Une résorption sévère peut augmenter le risque de perte prématurée des dents.

- **Dent non vitale ou morte :** Une dent traumatisée peut mourir sur une longue période ou sans traitement orthodontique. Cette dent peut se décolorer ou s'enflammer lors d'un traitement orthodontique. Il pourrait se détériorer pendant le traitement entraînant une perte osseuse autour des dents. Une excellente hygiène buccale et des nettoyages fréquents par votre dentiste peuvent aider à contrôler cette situation.

- **Événements inhabituels :** ingestion d'appareils, dents ébréchées, restaurations délogées.

FACTEURS PRÉVISIBLES QUI PEUVENT AFFECTER LE RÉSULTAT DU TRAITEMENT ORTHODONTIQUE :

Coopération : Dans la grande majorité des cas d'orthodontie, une amélioration significative peut être obtenue avec la coopération du patient.

Entretien des appareils : Un manque de brossage augmente le risque de carie lors du port d'un appareil dentaire. Une excellente hygiène bucco-dentaire, une réduction du sucre, une alimentation sélective et le signalement de toute bande lâche dès qu'elle est remarquée, aideront à minimiser la carie, les taches blanches (décalcification) et les maladies/problèmes des gencives. **Des visites de routine tous les 3 à 6 mois chez votre dentiste pour le nettoyage et les vérifications des cavités sont essentielles pendant le traitement !!!**

Porter des élastiques : Ce sont des forces placées sur les dents pour qu'elles se déplacent dans leurs positions appropriées. La durée de port affecte les résultats. **DOIT PORTER COMME INSTRUCTION !** Si le harnais est détaché des tubes ou de l'arc alors que la force élastique est engagée, il peut revenir en arrière et provoquer des blessures.

Les rendez-vous doivent être respectés : les rendez-vous manqués créent de nombreux problèmes d'horaire et allongent la durée du traitement.

Je consens à la prise de photographies et de radiographies avant, pendant et après le traitement et à leur utilisation par le dentiste lors de démonstrations.

Je certifie que j'ai lu ou qu'on m'a lu le contenu de ce formulaire et que je réalise les risques et les limites encourus et que je consens au traitement orthodontique.

Patient(e): _____

Parent/Guardian: _____

Témoin: _____